

KOMUNIKAT PYŁKOWY DLA ALERGIKÓW – RYNEK GŁÓWNY

Z DNIA 27 LIPCA 2010 r.

Trwa główny sezon pyłkowy.

Stężenie pyłku pokrzywy jest nadal wysokie, z tendencją spadkową, natomiast stężenie pyłku traw jest średnie. Stężenie pyłku szczawiu, babki i bylicy jest niskie. Występują pojedyncze ziarna pyłku komosy i ambrozji.

Stężenie badanych zarodników grzybów jest wysokie, jednak opady deszczu mogą wpłynąć na kilkudniowy spadek stężenia.

TAKSON	STĘŻENIE	PROGNOZA
Trawy	ŚREDNIE	spadek
BABKA	NISKIE	Bez zmian
SZCZAW	NISKIE	Bez zmian
POKRZYWA	WYSOKIE	spadek
BYLICA	NISKIE	wzrost
<i>Alternaria</i>	WYSOKIE	wzrost
<i>Cladosporium</i>	WYSOKIE	Wzrost
<i>Ganoderma</i>	WYSOKIE	Wzrost
<i>Epicoccum</i>	WYSOKIE	Wzrost

TAKSON	STĘŻENIE	PROGNOZA
Trawy		↓
BABKA		—
SZCZAW		—
POKRZYWA		↓
BYLICA		↑
<i>Alternaria</i>		↓
<i>Cladosporium</i>		↓
<i>Ganoderma</i>		↓
<i>Epicoccum</i>		↓

